

Цефинель
(порошок для инъекций)
листок-вкладыш

Описание

Порошок белого или бледно-желтого цвета.

Состав

1 флакон препарата содержит действующее вещество:

цефтиофура натрия соль стерильная в перерасчете на цефтиофур (основу)- 1 г.

Фармакологические свойства

Цефтиофур принадлежит к третьей генерации антибиотиков цефалоспоринового ряда. Препарат имеет широкий спектр антибактериального действия и является активным по отношению к грамположительным и грамотрицательным микроорганизмам, в том числе штаммам, которые продуцируют β -лактамазу, и некоторые виды анаэробных бактерий: *Pasteurella haemolytica*, *Pasteurella multocida*, *Actinobacillus (Haemophilus) somnus*, *Fusobacterium necroforum*, *Bacteroides melaninogenicus*, *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Pasteurella multocida*, *Streptococcus suis*, *Streptococcus zooepidemicus*, *Streptococcus equi*, *Staphylococcus ssp.*, *Pasteurella ssp.*, *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*. Антибактериальное действие цефтиофура реализуется по механизму угнетения синтеза клеточной стенки бактерий.

Применение

Крупный рогатый скот: лечение животных при заболеваниях органов дыхания, которые вызваны *Pasteurella (Mannheimia) haemolytica*, *Pasteurella multocida*, *Histophilus somni*, а также животных, больных острым межпальцевым некробациллезом, который вызван *Fusobacterium necrophorum*, *Bacteroides melaninogenicus*, которые чувствительны к цефтиофуру.

Свины: лечение животных при заболеваниях органов дыхания, которые вызваны *Actinobacillus (Haemophilus) pleuropneumoniae*, *Pasteurella multocida*, *Salmonella choleraesuis* и *Streptococcus suis*, которые чувствительны к цефтиофуру.

Кони: лечение животных при заболеваниях органов дыхания, которые вызваны *Streptococcus zooepidemicus*, которые чувствительны к цефтиофуру.

Собаки: лечение животных, больных полиартритом, а также при заболеваниях органов дыхания, мочевыводящих путей и кожи, которые вызваны *Escherichia coli* и *Proteus mirabilis*, которые чувствительны к цефтиофуру.

Однодневные цыплята и индейки: предупреждение ранней смертности, которая вызвана *E. coli* и *Staphylococcus aureus*, которые чувствительны к цефтиофуру.

Дозирование

Содержимое одного флакона растворяют в 20 мл стерильной воды для инъекций. 1 мл приготовленного стандартного раствора содержит 50 мг цефтиофура в виде натриевой соли.

Срок использования полученного раствора составляет: 12 часов при хранении в темном месте при температуре от 15 до 30 °С, при хранении в холодильнике при температуре от 2 до 8 °С – 7 суток.

При хранении в замороженном состоянии при температуре от минус 4 до минус 18 °С – 8 недель. Замороженный раствор размораживать при температуре 37 °С и не замораживать его повторно.

Внутримышечно в дозе:

Крупный рогатый скот - 1 мл раствора препарата на 50 кг массы тела (1 мг цефтиофура на 1 кг массы тела). В место инъекции может быть введено не более 15 мл стерильного раствора препарата. Препарат применяют один раз в сутки в течение 3-5 суток – при лечении заболеваний органов дыхания, а при лечении межпальцевых некробациллезов – в течение 3 суток;

свины - 1 мл раствора препарата на 16 кг массы тела (3 мг цефтиофура на 1 кг массы тела) один раз в сутки в течение 3 суток;

кони - 2 мг цефтиофура на 1 кг массы тела (1 мл раствора препарата на 25 кг массы тела) 1 раз в сутки в течение 10 суток с интервалом 24 часа между введениями. В место инъекции может быть введено не больше 10 мл стерильного раствора препарата. Лечение длится в течение 48 часов после исчезновения клинических признаков заболевания, но не более 10 суток.

Подкожно в дозе:

собаки - при лечении заболеваний органов дыхания - 0,6 мл раствора препарата на 10 кг массы тела (3,3 мг цефтиофура на кг массы тела) в течение 5 суток; при заболеваниях мочеполовых путей - 0,8 мл раствора препарата на 10 кг массы тела (4,4 мг цефтиофура на кг массы тела) в течение 8-10 суток. При заболеваниях кожи доза составляет 0,4-0,8 мл раствора препарата на 10 кг массы тела (2,2-4,4 мг цефтиофура на кг массы тела) в течение 10 суток. При гнойных ранах доза составляет 0,6 мл раствора препарата на 10 кг массы тела (3,3 мг цефтиофура на 1 кг массы тела) в течение 8-10 суток. При лечении полиартрита препарат вводят в дозе 0,8 мл раствора препарата на 10 кг массы тела (4,4 мг цефтиофура на 1 кг массы тела) в течение 8 суток. Дозирование и продолжительность курса лечения зависит от степени тяжести заболеваний;

однодневные цыплята - 0,2 мл раствора препарата на голову (в область шеи); Перед применением стандартный раствор препарата (50 мг/мл) разводят с таким расчетом, чтобы в 0,2 мл раствора содержалось 0,08-0,2 мг цефтиофура на цыпленка;

однодневные индейки - в дозе 0,2 мл раствора препарата на голову (в область шеи); Перед применением стандартный раствор препарата (50 мг/мл) разводят с таким расчетом, чтобы в 0,2 мл раствора содержалось 0,2-0,5 мг цефтиофура на цыпленка (1 мл раствора препарата на 100 - 294 голов).

Противопоказания

Не применять животным с повышенной чувствительностью к цефтиофуру или другим бета-лактамным антибиотикам.

Предосторожности

Препарат не назначают животным, если известно о их индивидуальной непереносимости цефалоспоринов. Локальное влияние цефтиофура может вызвать аллергические реакции у чувствительных лиц. Лицам с известной гиперчувствительностью к пенициллинам и цефалоспорином нужно избегать контакта с препаратом. Повторное или продолжительное влияние цефтиофура может привести к сенсibilизации. Избегать контакта препарата с одеждой, кожей, глазами и ртом. При случайном попадании в глаза промывать водой 15 минут. При случайном попадании на кожу промыть с мылом, избавиться от загрязненной одежды. Если после контакта с препаратом наблюдается аллергическая реакция (например, кожная сыпь, крапивница, затрудненное дыхание) нужно немедленно обратиться к врачу.

Забой животных на мясо разрешается через 24 часов (крупный рогатый скот), 48 часов (свиньи), 21 сутки (цыплята, индюшата) после последнего применения препарата. Период выведения для молока составляет 0 часов. Полученное, до указанного срока, мясо утилизируют или скормливают непродуцирующим животным, в зависимости от вывода врача ветеринарной медицины.

Форма выпуска

Флаконы из прозрачного стекла, закрытые резиновыми пробками под алюминиевую обкатку, по 1 г.

Хранение.

Сухое, темное, недоступное для детей место при температуре от 15° до 25°С.

Срок годности препарата – 1 год.

Для применения в ветеринарной медицине!

Владелец регистрационного удостоверения

ПАО «Киевмедпрепарат»

01032, Украина, г. Киев, ул. Саксаганского, 139.

Производитель готового продукта

ПАО «Киевмедпрепарат»

01032, Украина, г. Киев, ул. Саксаганского, 139.